

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**USO AGRONÓMICO**

**MODO DE ACCIÓN:** Imbirex CR 80 SL es un coadyuvante agrícola que mejora las propiedades adherentes, dispersantes, penetrantes y humectantes de los plaguicidas, fertilizantes foliares y defoliantes.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Este producto puede aplicarse con equipo manual de espalda, de motor, equipo terrestre acoplado al tractor o con equipo aéreo. No presenta acción sobre el equipo

**FORMA DE APLICACIÓN DE LA MEZCLA:** para preparar la

mezcla de aplicación llene el tanque con agua hasta la mitad, agregue la dosis de **Imbirex CR 80 SL**, agite y luego agregue el agroquímico, finalmente termine de llenar el volumen del taque, mantenga activado el sistema de agitación. El pH de la mezcla debe ser ajustado al recomendado para el agroquímico que acompaña.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

**ÁMBITO DE APLICACIÓN:** El **Imbirex CR 80 SL** está indicado para todo tipo de cultivo tanto en campo abierto como en invernaderos. No se recomienda utilizar en el cultivo de tabaco.

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** **Imbirex CR 80 SL** es un coadyuvante agrícola que mejora las propiedades adherentes, dispersantes, penetrantes y humectantes de los plaguicidas, fertilizantes foliares y defoliantes.

**PLAGAS A CONTROLAR:** las que se indique para el plaguicida acompañante de la mezcla.

**DOSIS RECOMENDADA:** 50 mililitros por cada 100 litros de agua. Para herbicidas de contacto e insecticidas de contacto: 100 mililitros por cada 100 litros de agua. En aplicaciones por avión: 1 mililitro de **Imbirex CR 80 SL** por litro de agua. Para emulsiones con aceite dosifique 1 mililitro por cada litro de aceite.

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** el producto está indicado para utilizarse según el plaguicida acompañante de la mezcla.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** el producto está indicado para utilizarse según el plaguicida acompañante de la mezcla.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** el producto está indicado para utilizarse según el plaguicida acompañante de la mezcla.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** el producto está indicado para utilizarse según el plaguicida acompañante de la mezcla.

**COMPATIBILIDAD:** Imbirex CR 80 SL, es compatible con la mayoría de plaguicidas, fertilizantes y defoliantes de aspersión utilizados en la agricultura.

**FITOTOXICIDAD:** Imbirex CR 80 SL es fitotóxico al cultivo de tabaco.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene en un lugar

fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

**PELIGROS FÍSICO-QUÍMICOS QUE REPRESENTA EL PRODUCTO:**

**INFLAMABILIDAD:** No es inflamable.  
**CORROSIVIDAD:** No es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

**BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Puede causar irritación de la piel, así como irritación a los ojos. Si se ingiere puede ser nocivo. En caso de estar en mezcla con agroquímicos, los síntomas estarán relacionados directamente con el producto con el que se mezcle **Imbirex CR 80 SL**.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** : No inducir vomito. Obtenga atención médica inmediatamente. Puede ser nocivo en caso de ingestión.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** : Enjuague la piel con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Si la irritación o el enrojecimiento persisten, busque atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y vigile la respiración. En caso necesario acudir al médico.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** : Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos, separando los párpados con los dedos. No permitir que la víctima cierre los ojos. Retirar los lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**



**ANTÍDOTO:**

Este producto no tiene antídoto específico.

**TRATAMIENTO MÉDICO:**

Dar tratamiento sintomático y de soporte. En caso de estar mezclado con otros agroquímicos, el tratamiento dependerá del producto con que se haya mezclado.

Fecha de creación:	Título:
28-04-2015	LABLE IMBIREX CR SL800 CEA84482544A
Tamaño LABLE: 190 x 130 MM	
Tintas(2): 1. Negro <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black;"></span> 2. Pantone 347 (Verde) <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green;"></span>	



**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 2251-3560
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322 (504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA	NICARAGUA	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 22231028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Moscoso Puello	REP. DOMINICANA	(809) 681-7828
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 223-0778
Hosp. Militar Carlos Finlay	CUBA	(537) 2601230 (537) 2608751
Villa Clara		(042) 22-6197 / 22-4770
Ciego de Ávila		(033) 49-1572 / 49-1575
Santiago de Cuba		(022) 64-1000 / 64-3864

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

**APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACÍE LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.**

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo si no se cumplen con las recomendaciones suministradas por el registrante. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

**EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS DE CARENENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS DE PRODUCCIÓN. EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN ES DE PLENA**

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONOCER LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DE SU MERCADO DE DESTINO, SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE EN CUANTO A LA DECISIÓN DE EXPORTACIÓN.

**FORMULADO POR:**

**Oxiteno Uruguay S.A**  
Cebollati 1474,  
Piso 4 Unidades  
401/402 Uruguay  
Tel. (598.2) 508 6380  
Fax (598.2) 507 0577-4492

**IMPORTADO POR:**

**Bayer, S.A.**  
km 29.5 Ruta al Pacífico  
Amatitlán, Guatemala  
Tels. 6628-7200 / 6628-7211

James Brodie & Co. Ltd.  
16 Regent Street  
P.O. Box 365  
Belize City, Belize  
Tel: (501) 2277070

**Bayer, S.A.**  
Complejo World Trade Center,  
Torre 1, Nivel 5,  
Calle el Mirador entre 87 y 89  
Av. Norte, Colonia Escalón  
San Salvador  
Tel.: (503) 2267-9000  
Bodega: Km 7.5  
Boulevard del Ejército Nacional,  
Parque Industrial Regina, Nave 4,  
Soyapango, San Salvador, El Salvador  
Tel.: (503) 2277-0701

**Bayer, S.A.**  
km 11,5 Carretera a Masaya  
Managua, Nicaragua  
Tels.: 505-2798311

**Bayer, S.A.**  
Oficentro Plaza Tempo, Edificio A (2do Piso)  
Autopista Próspero Fernández,  
contiguo al Hospital CIMA, Escazú  
Tel.: 25056300, 41006300  
Fax: 25056305, 41006305

**Bayer, S.A. de C.V.**  
Boulevard Morazán, Colonia Castaño Sur  
Avenida Ramon Ernesto Cruz  
Calle Cedro Real Sur Este  
Frente a Seguros Crefisa  
Tegucigalpa, Honduras.  
Tels: (504) 269-2100, 240-5100

**Bayer Panamá, S.A.**  
Complejo Global Business Terminal  
Avenida Domingo Díaz  
Torre A, 5to piso  
El Dorado, Panamá  
Tel: 2716100 Fax: 2716106

**Bayer, S.A.**  
Avenida Luperón  
Zona Industrial de Herrera  
Sto. Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: 1-809-5308066

**Big Creek Group of Companies**  
Banana Enterprises Limited Agro Division  
BELAGRO  
Big Creek, Stamm Creek District  
Tel: (501) 523-2166/2003

**Bayer, S.A.**  
Calle 17A, No. 17425 (Casa 69) el/ 174 y 190,  
Cubanacán Playa,  
Ciudad de La Habana, Cuba  
Tel.: (537) 204-1383

**Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.**  
Mile 8 Western Highway  
P.O. Box 566  
Belize City, Belize  
Tel: (501) 235410

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-666	17-11-11
EL SALVADOR	33-666	12-12-13
HONDURAS	702-124-I	02-02-12
NICARAGUA	BY-028G-2012	03-09-12
COSTA RICA	5292	23-05-11
PANAMA	5533	01-06-11
BELICE	0075-35	29-03-12
R. DOMINICANA	4347	19-11-13

CEAB4482544A