

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**



NISSORUN 5 EC

**ACARICIDA-TIAZOLIDINA
HEXITIAZOX**

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: DIMETIL BENCENO, DENSIDAD: 0.918 g/ml a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICION**

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION

**MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:

Este es un acaricida específico que tiene acción ovidica, larvídica contra muchas clases de ácaros fitófagos. Actúa como un veneno de contacto y estomacal. Tiene acción translaminar.

EQUIPO DE APLICACION:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 400-600 litros por hectárea. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco.

Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARAR LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

COSTA RICA

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS, EPOCA E INTERVALO DE APLICACION
Salvia <i>Salvia axial</i>	Arañita roja <i>Tetranychus urticae</i>	1 ml/l de agua
Crisantemo <i>Crysanthemum spp</i>	Arañita roja <i>Tetranychus urticae</i>	Aplicar en las etapas tempranas a la infestación de los ácaros, debido a que los ácaros se propagan rápidamente y que el control se dificulta cuando la densidad de la población es alta. Si se aplica en etapas tardías de un ataque, se recomienda mezclarlo con un adulcificado para un mejor control.
Rosa <i>Rosa spp</i>	Arañita roja <i>Tetranychus urticae</i>	
Zinnia <i>Zinnia spp</i>	Arañita roja <i>Tetranychus urticae</i>	Por lo general basta una aplicación por cosecha, pero el intervalo y el número de aplicaciones dependerán del nivel de la población de ácaro.
China <i>Impatiens spp</i>	Arañita roja <i>Tetranychus urticae</i>	
Begonia <i>Begonia spp</i>	Arañita roja <i>Tetranychus urticae</i>	Aplicar cuando se requiera de acuerdo con el nivel crítico de la población.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y COSECHA:

Sin restricción por tratarse de ornamentales

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Debe esperar a que se seque el rocío aplicado sobre las plantas. En caso necesario de reingreso al área tratada durante el período use equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común en el cultivo de ornamentales. Únicamente debe evitarse su aplicación en mezcla con productos fuertemente alcalinos como el caldo bordeles.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No almacenar con herbicidas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y del fuego a temperaturas no mayores a 25° C, ni menores de 0° C y lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas y animales domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar. Esta formulación es inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**

**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Dolor de cabeza, náuseas, mareos, vértigo. Puede causar irritación en ojos, nariz, garganta y piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: NO PROVOCAR EL VOMITO. POR EL RIESGO DE ASPIRACION PULMONAR. Obtenga atención médica inmediatamente.

INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Qúitese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES

PAIS:
COSTA RICA

TELEFONO:
2233-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS
TÓXICO PARA ABEJAS**



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su empaque original y debidamente cerrado y etiquetado.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado herméticamente. También garantizan la calidad del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FORMULADOR:

NIPPON SODA CO., LTDA. 2-1, Ohtemachi, Chiyota-Ku, Tokio, Japón. Tel.: (03)3245-6288. Fax: (03) 3245-6289

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

LA CASA DEL AGRICULTOR S.A. CASAGRI, CARTAGO, COSTA RICA, APDO. POSTAL 19-7050, TEL.: 2590-0500 • FAX: 2590-0505

PAIS
COSTA RICA

NO. REGISTRO
3671

FECHA DE REGISTRO
30-05-95