

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

 **Casagri**
FUJI-ONE 40 EC

**FUNGICIDA-DITOLANO
ISOPROTHIOLANE**

ANTIDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: DIMETIL BENCENO

DENSIDAD: 1.03 g/ml a 20° C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**



**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Este es un fungicida Ditolano sistémico, para el control de la Piricularia en el cultivo de arroz. Es absorbido por el follaje y se transloca vía simplato. Controla esta enfermedad tanto en su fase inicial como en ataques tardíos en la panoja. FUJI-ONE 40 EC impide el crecimiento y penetración del hongo en el follaje de las plantas de arroz.

En infecciones ya establecidas anula la reproducción del patógeno y detiene la enfermedad.

EQUIPO DE APLICACION:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 200-800 litros por hectárea. Con equipo aéreo el volumen de aplicación es de 75-80 litros por hectárea. Las aplicaciones aéreas deben hacerse cuando casi no se tengan vientos y las temperaturas no sean mayores a 32°C. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco. Este producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación, en un recipiente aparte mezcle la cantidad requerida del producto con un poco de agua hasta obtener una pasta semilíquida, luego llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la pasta semilíquida y termine de llenar el tanque con agua limpia. El líquido y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

COSTA RICA

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS, EPOCA E INTERVALO DE APLICACION
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Pericularia o quemada del arroz <i>Pericularia oryzae</i>	Utilice 1-1.5 l/ha. Aplicar antes de la floración. Repetir la aplicación 15-20 días después de período de espigamiento, para controlar el fuerte daño que provoca este hongo en este estado del cultivo. Esta es la etapa de mayor susceptibilidad del arroz al ataque de este hongo.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y COSECHA: 14 días

INTERVALO REINGRESO AL AREA TRATADA:

Esperar que se seque el rocío aplicado sobre el follaje, si es necesario entrar antes de este período debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las especificaciones recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común en este cultivo, tales como Mancozeb, Metamidofos, Kasugamicina, IBP insecticidas petroides y fertilizantes foliares en general.

Únicamente debe evitarse su aplicación en mezcla con productos fuertemente alcalinos como el caldo bordeles

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, semillas, ropa, utensilios de uso doméstico. No almacenar junto con herbicidas. Almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor y del fuego; a temperaturas no mayores a 25°C, ni menores de 0°C, alejado de animales domésticos y los niños. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.
ESTA FORMULA ES INFLAMABLE.



**NO ALMACENE ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO Llave FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si ha habido ingestión puede presentar rinorrea: salivación, urinación incontinente y diarrea. Además hemorragia ocular y secreción nasal.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: NO PROVOCAR EL VOMITO POR EL RIESGO DE ASPIRACION PULMONAR. Obtenga atención médica inmediatamente.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención medica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN
Centro Nacional de Intoxicaciones

PAÍS
Costa Rica

TELÉFONO
2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

TÓXICO PARA AVEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia siempre y cuando se le de el buen uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

NIHON NOHYAKU CO., LTD 2-5 Nihonbashi 1 Chome Chuo-ko, Tokyo, 103 Japón, Tel.: (03) 271-8645 - Fax: (03) 281-2403

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

LA CASA DEL AGRICULTOR S.A. CASAGRI, CARTAGO, COSTA RICA Tel.: 2590-0565 - Fax: 2590-0550

PAÍS
COSTA RICA

NÚMERO REGISTRO
3082

FECHA REGISTRO
06-09-91

PERMISO DE REEMPAQUE MAG N° 10