



Bayer CropScience

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Prevalor® 84 SL

FUNGICIDA-CARBAMATO, FOSFÓNICO
PROPAMOCARB- FOSETIL ALUMINIO

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,12 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Prevalor 84 SL, es una combinación optimizada de los principios activos de Propamocarb y Fosetyl-al. El modo de acción de cada ingrediente activo en esta formulación esta basado en una inhibición en múltiples sitios del metabolismo del hongo (acción multisitio). Consecuentemente, el riesgo que se desarrolle resistencia en esta formulación es muy bajo. Prevalor 84 SL, ofrece sinergismo al combinar un acción fungicida con una resistencia sistémica adquirida por la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilice dosificadores, bombas de mochila, equipo accionado con tractor. Antes de hacer la aplicación verifique que su equipo se encuentre en buen estado. Debe evitar dejar mezclas de un día para otro.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregue la dosis correcta en el volumen de la mezcla a utilizar, mezcle bien y viértalo al depósito del equipo de aplicación. Es importante disponer de dosificadores, paletas de agitación y envases grandes para la preparación de la mezcla. Mantenga su equipo de aplicación en buenas condiciones y dele el mantenimiento adecuado. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO: Usos recomendados para: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

CULTIVO	ENFERMEDADES
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Tizón tardío
Cebolla <i>Allium cepa</i>	<i>Phytophthora infestans</i>
Ajo <i>Allium sativum</i>	Mildiu vellosa
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Peronospora</i> spp.
Fresa <i>Fragaria vesca</i>	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Gomosis
Mora <i>Rubus fruticosus</i>	<i>Phytophthora</i> spp.
Frambuesa <i>Rubus idaeus</i>	Pata negra
Sandia <i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Phytophthora</i> spp.
Apio <i>Apium graveolens</i>	Moho azul
Güicoy <i>Cucurbita</i> spp.	<i>Peronospora tabaci</i>
Repollo <i>Brassica oleracea</i>	Pudrición del cuello
Espinaca <i>Spinacia oleracea</i>	<i>Phytophthora palmivora</i>
Pepino <i>Cucumis sativum</i>	Corazón rojo
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	<i>Phytophthora fragariae</i>
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Raya negra
Aguacate <i>Persea americana</i>	<i>Phytophthora plmivora</i>
Uva <i>Vitis vinifera</i>	Mal del talluelo
Brócoli <i>Brassica oleracea</i> vr. <i>italica</i>	<i>Eythium</i> spp.
Hule <i>Hevea</i> spp.	Mancha de la hoja
Melón <i>Cucumis melo</i>	<i>Bremia lactucae</i>
Coliflor <i>Brassica oleracea</i>	
Cítricos <i>Citrus</i> spp.	
Chile <i>Capsicum annuum</i>	
Ornamentales	

AL realizar la mezcla de tanque, antes de la aplicación, los aplicadores deben asegurarse de utilizar agua, con un pH neutro de preferencia o en el rango de 6 a 8 y chequear que la dureza no sea mayor de 500 ppm.

USOS AUTORIZADOS PARA COSTA RICA:

CULTIVO	ENFERMEDAD	ETAPA
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	Vegetativa
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildiu vellosa <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Vegetativa

DOSIS RECOMENDADAS PARA APLICACIONES FOLIARES:

1,5 - 2 l/ha (1 l/mz). Aplicar de 2 - 2,5 medidas Bayer / rociadora de 16 litros.

DOSIS RECOMENDADAS DE APLICACIONES AL SUELO:

Aplicación en semilleros o bandejas

1.5 ml / lt de agua

1 medida Bayer / bomba de 16 lts de agua.

Recomendaciones

- Se recomienda de 2 a 3 aplicaciones hasta antes del trasplante.
- Se puede mezclar con Confidor.

Aplicaciones en campo

2 - 2.5 lt / ha

2.5 cc -3 cc / lt de agua

2 copas Bayer / bomba de 16 lts de agua

Recomendaciones

- Aplicaciones al suelo utilizar de 2cc a 2.5cc de Prevalor / lt de agua.

- Aplicar directamente a la base de la planta 50 cc de la solución en dos diferentes puntos.

- Se recomienda por lo menos de 2-3 aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.

- Hacer la primera aplicación al momento del trasplante, es recomendable mezclarlo con Confidor. La segunda aplicación 14 días después.

Aplicaciones por riego o goteo

2 - 2.5 lt / ha

Recomendaciones

- Aplicar la dosis y regar posteriormente de 7-20 m³ de agua/ha para asegurar bien la cobertura del suelo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: Prevalor 84 SL no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda en mezclas con productos a base de cobre o con fertilizantes foliares nitrogenados. Además no se recomienda hacer mezclas con formulaciones aceitosas, puesto que impide la penetración del producto a la planta.

Medidas del panfleto: 190 mm largo X 130 mm alto

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conservar y transportar el **Prevalor 84 SL**, en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No trasportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, herbicidas, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, recójalo con una pala y luego aplíquelo en el cultivo según las recomendaciones del producto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En ciertos casos se puede presentar letargo, ataxia y espasmos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Alejar al paciente del área contaminada hacia un lugar fresco y ventilado. Manténgalo en reposo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con agua limpia por 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: **Prevalor 84 SL**, no tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica Hospital San Rafael	GUATEMALA EL SALVADOR	(502) 22320735 (503) 2525-5800 ext.148/149
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322 (504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	NICARAGUA COSTA RICA	(505) 289 7150 (506) 22231028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Luis Aybar	REP. DOMINICANA	(809) 684 3478
Hospital Dr. Moscoso Puello		(809) 681-2913
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 2 30778

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y
ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON
ENVASES O EMPAQUES VACIOS**



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Inutilice los envases vacíos, perforeslos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DE CARENANCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO

A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y DEL PAÍS IMPORTADOR, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS O AL TÉCNICO EN LA MATERIA.

FORMULADO POR:
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel Strasse 50
D-513268 Leverkusen
Alemania

IMPORTADO POR:

Bayer S.A.
km 29.5 Ruta al Pacífico
Amatitlán, Guatemala
Tels. 6628-7200 / 6628-7211

Bayer S.A.
km 11.5 Carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
505-2798311

Bayer S.A.
Calle El Progreso No. 2748
Cof. Fior Blanca, Apdo. Postal 494
San Salvador, El Salvador
(503) 22679000 / 22782000

Bayer S.A.
Eurocenter II, 5to piso
400mts al Este del Centro
Comercial Real Cariari,
Barreal de Heredia, Costa Rica
506-2589-8900, 2589-8600

Bayer, S.A. de C.V.
Boulevard Morazán, Colonia Castaño Sur
Avenida Ramon Ernesto Cruz
Calle Cedro Real Sur Este
Frente a Seguros Crefisa
Teguicigalpa, Honduras.
Tels: (504) 269-2100, 240-5100

Bayer Panamá S.A.
Parque Industrial de Costa del Este
Calle 1ra. Edif. No. 95
Corregimiento de Parque Lefevre
Ciudad Panamá
Tel. 00507 4412640

Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.
Mile 8 Western Highway
P.O. Box 566
Belize City, Belize
Tel: (501) 235410

Bayer S.A.
Avenida Luperón
Zona Industrial de Herrera
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel.:1-809-5308086

James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street
P.O. Box 365
Belize City, Belize
Tel: (501) 2277070

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-639	29-02-08
EL SALVADOR	33-639	07-07-11
HONDURAS		
NICARAGUA	BY-001D-2-2007	07-07-07
COSTA RICA	8702369	24-03-10
PANAMÁ	1762	23-08-07
REP. DOMINICANA	3645	18-02-11

Medidas del panfleto: 190 mm largo X 130 mm alto