



Bayer CropScience

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Verita® 71,1 WG
FUNGICIDA-FOSFÓNICO, IMIDAZOLINONA
FOSETYLAL, FENAMIDONE

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Verita 71,1 WG combina la acción de dos ingredientes activos: el fosetyl actúa en forma sistémica acropetal y basipetal (vía floema y xilema), con acción protectante y curativa, inhibiendo la germinación de las esporas o por bloqueo del desarrollo del micelio del hongo. La Fenamidona actúa inhibiendo las diferentes etapas del ciclo de vida de los hongos y la liberación de las esporas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Verifique que el equipo de aplicación, bomba de espalda o equipo mecánico terrestre esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación. Se debe utilizar boquillas de cono.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene hasta la mitad de mezcla, agregue la dosis de Verita 71,1 WG, agite y termine de llenar con agua. Se recomienda tener a mano el siguiente equipo auxiliar: dosificadores, paletas de aplicación, cubetas, toneles y cepillos. Después de terminada la labor de aplicación es necesario lavar el equipo y darle mantenimiento adecuado.



RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

CULTIVOS	ENFERMEDADES
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Mancha foliar gris <i>Septoria spp.</i>
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>
Melón Cucumis melo Pepeño Cucumis sativus	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Calabazas <i>Cucurbita spp.</i>	Cladosporium cucumerinum Moho felpudo <i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Tabaco <i>Nicotiana glauca</i>	Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i> Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora palmivora</i>
Repollo Brassica <i>oleracea var capitata</i>	Alternaria <i>Alternaria brassicae</i>
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Moho felpudo <i>Peronospora brassicae</i>
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Moho felpudo <i>Bremia lactucae</i>
Uva <i>Vitis vinifera</i>	Mancha roja <i>Pseudopeziza lactucivola</i> Antracnosis <i>Esophage ampelina</i> Mancha negra <i>Gauquericola viticola</i> Moho felpudo <i>Uromyces viticola</i>

CULTIVOS **ENFERMEDADES**

Citricos <i>Citrus spp.</i>	<i>Phytophthora spp.</i>
En diorch humedado durante la producción de plantas jóvenes y en el campo. Aplicar cerca de las raíces.	
Chile <i>Capsicum annuum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria sp.</i> Tizón tardío <i>Phytophthora capsici</i>
Ornamentales	Moho felpudo <i>Peronospora sp.</i>
Antes de hacer tratamiento general, hacer pruebas previas.	
Hule <i>Hevea brasiliensis</i>	Raya negra <i>Phytophthora sp.</i>

DOSIS:

- Para hule: Aplicar 50 g de Verita 71,1 WG por galón de agua directamente sobre el panel de pica con una brocha.
- Resto de cultivos: Aplicar de 2,0 - 2,5 kg/ha. 750 g por tonel de 200 litros de agua o 60 gr por aspersora de 16 litros de agua.

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1,5 - 2,0 kg/ha
Melón Cucumis melo Pepeño Cucumis sativus Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Moho felpudo <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2,0 kg/ha

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: Verita 71,1 WG no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones. Algunas variedades de Ornamentales pueden ser susceptibles, por lo que es recomendable hacer pruebas previas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado. No se recomienda en mezclas con cobre o con fertilizantes foliares que contengan alta concentración de nitrógeno. También puede aplicarse en mezcla con Silvacur Combi 30 EC. 25 ml por galón de agua para el control de *Ceratocystis fimbriata*.

Medidas de panfleto: 190mm largo x 130mm alto

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conserve y transporte **Vertra 71,1 WG** en su empaque original bien cerrado y etiquetado. No almacenarlo ni transportarlo junto a herbicidas, fertilizantes, alimentos y medicamentos. Almacénalo en un lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, recójalo con una pala y luego aplíquelo en el cultivo según las recomendaciones del producto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAJÉSE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACION: Se presenta irritación de los ojos, reacciones alérgicas y temblores, espasmos, disnea.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: **Vertra 71,1 WG** no tiene antídoto seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 22320735
Centro Nacional de Información Toxicológica	EL SALVADOR	(503) 5235-5800 ext: 148/149
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322
Depto. de Toxicología /MINSA	NICARAGUA	(505) 289 7150
Centro Nacional para el	COSTA RICA	(506) 22231028
Control de las Intoxicaciones	PANAMA	(507) 5234948
Medicamentos y Tóxicos	REP DOMINICANA	(809) 884 3478
Hospital Dr. Luis Aylar	REPUBLICA DE EL SALVADOR	(809) 884 2913
Hospital Dr. Moscoso Puello	EL SALVADOR	(501) 2 30778
Karl Heusser Memorial Hospital	EL SALVADOR	(501) 2 30778

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Inutilice las bolsas vacías, rómpalas y elimínelas según la legislación y las normas legales vigentes. **EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo. **EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO A LOS PERIODOS DE CARENANCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACION RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y**

DEL PAÍS IMPORTADOR. ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO, EN CASO DE DUDA, CONSULTAR LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS AL TÉCNICO EN LA MATERIA.

FORMULADO POR:

Bayer CropScience S.A.
Villfranche
Francia

IMPORTADO POR:

Bayer S.A.
Km 29.5 Ruta al Pacífico
Amalán, Guatemala
Tels. 6026/7200 / 6026/7211

Bayer S.A.
Calle El Progreso No. 2748
Cm. Frijolera, Apdo. Postal 494
San Salvador, El Salvador
(503) 2267 9000 / 22782000

Bayer S.A. de C.V.
Boulevard Morazan Colonia Casatón Sur
Avenida Ramón Ernesto Cruz
Calle Cedro Real Sur Este
Frente a Seguros Ortelis
Tepic, Jalisco, México
Tels. (504) 269-2100, 240-5100

Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.
Mile 8 Western Highway
P.O. Box 566
Belize City, Belize
Tel: (501) 225410
James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street
P.O. Box 365
Belize City, Belize
Tel: (501) 2277070

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	35-611	03-05-05
EL SALVADOR	358-186-II	07-06-05
HONDURAS	B*-131C-6-2005	04-07-05
NICARAGUA	870250	20-04-09
COSTA RICA	1788	07-12-05
PANAMA		
PARAGUAY		
PERÚ		
REPUBLICA DE EL SALVADOR		
URUGUAY		
VENEZUELA		

Medidas de panfleto: 190mm largo x 130mm alto