

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**



APPLAUD 25 WP

INSECTICIDA - TIADIAZINA
BUPROFEZIN

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**



**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un insecticida tiadiazina, regulador del crecimiento en los insectos. Este es un insecticida selectivo ya que no afecta los insectos benéficos como avispas parásitas y ácaros depredadores. En las plagas provoca la muerte de las ninfas en el tiempo de muda. Adicionalmente las orugas (larvas) mueren sin separarse del caparazón madre.

Asimismo suprime la oviposición en los adultos e incrementa la oviposición de huevos no fértiles.

EQUIPO DE APLICACION:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 200-800 litros por hectárea. Con equipo aéreo el volumen de aplicación es de 75-80 litros por hectárea.

Las aplicaciones aéreas deben hacerse cuando casi no se tenga vientos y las temperaturas no sean mayores a 32° C. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco.

Este producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.

Utilice botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación, en un recipiente aparte mezcle la cantidad del producto con un poco de agua hasta obtener una pasta semiliquida, luego llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la pasta semiliquida y termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas.

Debe de usar guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos durante el lavado del equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO:

COSTA RICA



CULTIVOS	PLAGA	DOSIS Kg / ha	DOSIS g / litro de agua	Intervalo de aplicación
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>		1.25	10 días
Naranja <i>Citrus spp</i>	Escama nevada <i>Unaspis citri</i>		4.0	30 días
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.5	1.25	10 - 15 días
Sandía <i>Citrullus vulgaris</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.5	1.25	10 - 15 días
Chile Dulce <i>Capsicum annum</i>	Cochinilla <i>Phenacoccus prob madeirensis</i>	0.6	1.25	5 - 10 días

EPOCA DE APLICACION:

Inicie la aplicación cuando la plaga alcance el nivel económico de aplicación. Hacer una buena cobertura del follaje.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 1 día

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con compuestos alcalinos como Sulfuro de Lima y Caldo Bordelés, Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas existentes en el mercado. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad para observar su comportamiento físico, así como las reacciones de la planta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto no es inflamable ni corrosivo. No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, y lejos del alcance de niños, personas discapacitadas, y animales domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Disminución de la función locomotora, lagrimeo y diarrea. Puede causar irritación de los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Induzca el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos y luego tocando la base posterior de la lengua con los dedos o algún objeto no punzocortante. Obtenga atención médica inmediatamente.

INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítense las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

INSTITUCION	PAIS	NUMERO TELEFONO
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:
TOXICO PARA PECES.**



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelo en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE Y FORMULADOR: NIHON NOHYAKU CO., LTD, 2-5 Nihonbashi1-chome, Chuo-Ku, Tokio Japón, Fax: 03-281-2443, Tel.: 03-271-8645

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

LA CASA DEL AGRICULTOR S.A. CASAGRI, CARTAGO, COSTA RICA. Tel.: 2590-0505 • Fax: 2590-0550

PAIS
Costa Rica

Nº DE REGISTRO
3635

FECHA DE REGISTRO
31-01-95