

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
Decis 10 EC, actúa por ingestión y por contacto. Su carácter liposoluble favorece su acción ya que la cutícula de los insectos, que es rica en lípidos, absorbe fácilmente el producto. El producto actúa sobre el sistema nervioso de los insectos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Para la aplicación de **Decis 10 EC**, puede utilizar aspersora de espalda, equipo accionado con tractor o avión, sin embargo, es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado. También debe utilizar boquillas de cono durante la aplicación de la mezcla.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Verter la mitad de agua en la aspersora, tonel o tanque mezclador. Agregue adherente o surfactante y agite la mezcla. Agregar la dosis de **Decis 10 EC** recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla (200 a 400 l/ha (140 – 280 l/mz)). Se recomienda tener a la mano paleta de agitación, cubetas, toneles y cepillos, es necesario lavar el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo y darle el mantenimiento adecuado. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

Usos recomendados para: Cuba, Guatemala, Belice, Honduras y República Dominicana.

CULTIVO	INSECTOS QUE CONTROLA
Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Ajonjolí <i>Sesamum indicum</i>	Perforador del fruto <i>Diaphania nitidalis</i> Perforador de la hoja <i>Diaphania hyalinata</i> Tortuguilla <i>Diabrotica</i> spp.

CULTIVO	INSECTOS QUE CONTROLA
Zapallo <i>Cucurbita</i> spp. Zuchini <i>Cucurbita</i> sp. Repollo <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Chile <i>Capsicum annuum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Apio <i>Apium graveolens</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativum</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Frijol ejotero (ejote) <i>Phaseolus vulgaris</i> Arvejas <i>Pisum sativum</i>	Afidos y pulgones <i>Aphis</i> spp., <i>Myzus</i> spp. Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i> Gusano de la col <i>Pieris monuste</i> Gusano del fruto <i>Heliothis</i> spp. Palomilla del repollo <i>Plutella xylostella</i> Picudo del chile <i>Anthonomus</i> spp. Chicharritas <i>Empoasca fabae</i> Gusano medidor <i>Alabama argillacea</i> Gusano de la hoja <i>Spodoptera</i> spp. Trips <i>Thrips tabaci</i> Conchuela mexicana <i>Epilachna varivestis</i> Picudo del ejote <i>Apion godmani</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i>

CULTIVOS EXTENSIVOS	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Picudo de arroz <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Sogata <i>Sogatodes oryzicola</i>
Maíz <i>Zea mays</i>	Tortuguilla <i>Diabrotica</i> spp. Gusano elotero <i>Heliothis</i> spp.
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>	Mosca midge <i>Contarinia sorghicola</i>
Café <i>Coffea arabica</i> Ornamentales	Minador de la hoja <i>Leucoptera coffeella</i> Trips <i>Frankliniella</i> spp. Gusano cogollero <i>Spodoptera</i> spp.

Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	Gusano bellotero <i>Heliothis</i> spp. Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i> Falso medidor <i>Pseudoplusia includens</i> Gusano medidor <i>Alabama argillacea</i> Gusano soldado <i>Spodoptera</i> spp. Afidos <i>Aphis gossypii</i>
---	--

DOSIS RECOMENDADA:

75 a 100 ml de **Decis 10 EC** por hectárea.
 50 a 75 ml de **Decis 10 EC** por manzana.

Usos autorizado para Nicaragua:

CULTIVO	INSECTOS QUE CONTROLA	DOSIS
Arroz	<i>Oebalus</i> spp.	0,25 l/ha

Usos autorizado para El Salvador, Costa Rica y Panamá:

CULTIVO	INSECTOS QUE CONTROLA	DOSIS
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,065 - 0,075 l/ha (0.0455 - 0.0525 l/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i>	Afidos <i>Aphis gossypii</i>	0,075-0,15 l/ha (0.0525 – 0.105 l/mz) con volumen de aplicación entre 500 y 600 l/ha (350 y 420 l/mz)

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Depende del grado de incidencia de las plagas, en melón aplicar cada 7 días y el resto de cultivos aplicar cada 8 a 15 días.


INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 4 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

Decis 10 EC no ocasiona fitotoxicidad si se aplica de acuerdo a las recomendaciones.

Fecha de creación:	Título:
10-12-2015	TABLE DECIS EC100 CEA58669036D
Tamaño LABEL: 250 x 130mm	
Tintas(2): 1. Negro ■ 2. Pantone Yellow-C (Amarillo) ■	



COMPATIBILIDAD:

Decis 10 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado. No mezclar con aquellos productos que son de reacción alcalina. Sin embargo, si no se tiene experiencia es necesario realizar una premezcla para determinar compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conservar y transportar el **Decis 10 EC** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, herbicidas, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco. **Decis 10 EC** es inflamable. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Excitabilidad, vómitos, temblores y respiración acelerada. Personas sensibles a piretroides presentan síntomas alérgicos del tracto respiratorio como: rinitis y broncoespasmos.

PRIMEROS AUXILIOS POR INGESTIÓN:

No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso

de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN:

Retirar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Manténgalo en reposo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS:

Lave inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL:

Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:

Decis 10 EC, no tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 2251-3560
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322 (504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA	NICARAGUA	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 22231028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Moscoso Puello	REP. DOMINICANA	(809) 681-7828
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 223-0778
Hosp. Militar Carlos Finlay	CUBA	(537) 2601230 (537) 2608761
Villa Clara		(042) 22-61917 / 22-4770
Ciego de Avila		(033) 49-1572 / 49-1575
Santiago de Cuba		(022) 64-1000 / 64-3864

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O

EMPAQUES VACÍOS

TÓXICO PARA ABEJAS

Aplicar fuera del horario de vuelo de las abejas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉQUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo si no se cumplen con las recomendaciones suministradas por el registrante. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS DE PRODUCCIÓN. EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN ES DE PLENA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONOCER LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DE SU MERCADO DE DESTINO, SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE EN CUANTO A LA DECISIÓN DE EXPORTACIÓN.

FORMULADO POR:

Bayer S.A.
km 29,5 Ruta al Pacífico
Amatitlán, Guatemala
6628-7200, 6628-7211

IMPORTADO POR:

Bayer, S.A.
km 29,5 Ruta al Pacífico
Amatitlán, Guatemala
Tels. 6628-7200 / 6628-7211

Bayer, S. A.
Complejo World Trade Center,
Torre 1, Nivel 5,
Calle el Mirador entre 87 y 89
Av. Norte, Colonia Escalón
San Salvador
Tel.: (503) 2267-9000
Bodega: Km 7.5
Boulevard del Ejército Nacional,
Parque Industrial Regina, Nave 4,
Soyapango, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2277-0701

Bayer, S.A. de C.V.
Boulevard Morazán, Colonia Castaño Sur
Avenida Ramón Ernesto Cruz
Calle Cedro Real Sur Este
Frente a Seguros Orifisa
Tegucigalpa, Honduras
Tels: (504) 269-2100, 240-6100

Big Creek Group of Companies
Banana Enterprises Limited Agro Division
BELAGRO
Big Creek, Stann Creek District
Tel: (501) 523-2166/2003

Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.
Mile 8 Western Highway
P.O. Box 566
Belize City, Belize
Tel: (501) 235410

James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street
P.O. Box 365
Belize City, Belize
Tel: (501) 2277070

Bayer, S.A.
km 11,5 Carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
Tels.: 305-2796311

Bayer, S. A.
Oficentro Plaza Tempo, Edificio A (2do Piso)
Autopista Próspero Fernández,
contiguo al Hospital CIMA Escazú
Tel: 2506300, 41006300
Fax: 2506305, 41006305

Bayer Panamá, S.A.
Complejo Global Business Terminal
Avenida Domingo Díaz
Torre A, 5to piso
El Dorado, Panamá
Tel: 2716100 Fax: 2716106

Bayer, S. A.
Avenida Luperón
Zona Industrial de Herrera
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel: 1-809-5308066

Bayer, S. A.
Calle 17A, No. 17425 (Casa 69) el 174 y 190,
Cubancán Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba
Tel.: (537) 204-1383

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-577	23-07-12
EL SALVADOR	AG-2004-10-725	27-10-04
HONDURAS	850-201-III	08-01-09
NICARAGUA	BY-064K-1-2004	01-06-15
COSTA RICA	870299	13-08-09
PANAMA	1734ab	20-07-15
REP. DOMINICANA	2624	23-11-10
CUBA	079/14	01-07-04

CEA66669036D