

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

**NONION
KAYAKU**
EVISECT 50 SP

**INSECTICIDA - TRITIANO
TIOICLAM-H-OXALATE**

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un insecticida tritiano que actúa sobre los insectos principalmente por contacto y por vía estomacal, al aplicarse se debe procurar una excelente cobertura del follaje.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 500-1000 litros por hectárea. Por vía aérea el volumen de aplicación es de 50-100 litros. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco.

Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación. Utilice guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la dosis recomendada del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas.

Debe de usar guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos durante el lavado del equipo de aplicación.



**RECOMENDACIONES DE USO:
COSTA RICA:**

CULTIVOS	PLAGAS	DOSES kg/ha	EPOCA E INTERVALO DE APLICACION
REPOLLO <i>Brassica oleracea var capitata</i>	Polilla <i>Plutella xylostella</i>	0.5	Aplique cuando la población de la plaga supere el umbral económico. Se recomienda repetir las aplicaciones cada 8-12 días, dependiendo de la presión de la plaga.
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Polilla <i>Scrotopalopsis spp</i>	0.75-1	Aplique cuando la población de la plaga supere el umbral económico. Se recomienda repetir las aplicaciones cada 7 días, dependiendo de la presión de la plaga.
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i> MEL PEPINO <i>Cucumis sativus</i>	Gusano del fruto <i>Heliothis spp</i> Gusano alambre <i>Keiferia lycopersicella</i>	0.5	Aplique cuando la población de la plaga supere el umbral económico. Se recomienda repetir las aplicaciones cada 8-12 días, dependiendo de la presión de la plaga.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:
En todos los cultivos es de 14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Debe esperar a que se seque el rocío aplicado sobre las plantas. En caso necesario de reingreso al área tratada durante el período use equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:
NO MEZCLE CON FUNGICIDAS CUPRICOS NI CON COMPUESTOS ALCALINOS. Recomendamos al usuario hacer una prueba bajo su responsabilidad y costo con las mezclas planeadas para observar aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre plantas tratadas en los 3 días siguientes a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto no es inflamable ni corrosivo. No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor, y lejos del alcance de niños, personas discapacitadas, y animales domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Nauseas, temblor de las extremidades y cuerpo en general, abundante secreción salival, espasmos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Induzca el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos y luego tocando la base posterior de la lengua con los dedos o algún objeto no punzocortante. Obtenga atención médica inmediatamente.

INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Qútese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL BOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCION	PAIS	TELEFONO
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**

TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelo en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto siempre y cuando se le de el buen uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FABRICANTE:

Nippon Kayaku Co. Ltda. Tokio Fujimi Bidg, 11-12 Fujimi 1-Cheme Chiyoda-Ku Tokio Japón

FORMULADOR:

FORMULACIONES QUIMICAS S.A. Chomes, Puntarenas, Costa Rica. Tel/Fax: 2661-2795

DISTRIBUIDO POR:

LA CASA DEL AGRICULTOR S.A. CASAGRI, CARTAGO, COSTA RICA • Tel.: 2590-0505 • Fax: 2590-0550

**PAIS
COSTA RICA**

**No. DE REGISTRO
2660**

**FECHA DE REGISTRO
16/09/94**

PERMISO DE REEMPAQUE M.A.G. N.º. 10